

12345


Segunda causa de morbilidad general en el Ecuador 2017.

71,1%



Porcentaje de pacientes por genero en el 2017

28,9%



1



5



1era Causa de morbilidad en mujeres, 5ta en hombres.



80%

De los pacientes con colelitiasis no tienen síntomas.


De Inicio abrupto en cuadrante superior derecho del abdomen.

Disminuye en 30 minutos a 3 horas.

Colico Biliar



a 3 horas



Complicaciones

20% de riesgo en 2 años de producir colecistitis (calculos en vesícula biliar), en pacientes sintomáticos

Cancer de vesícula biliar < 1 %

Escanea Código Qr



Colecistectomía es el procedimiento quirúrgico para el tratamiento de colelitiasis - colecistitis.

Tecnica laparoscópica es la mas utilizada (>95%), recuperación corta, y dolor leve.


Tecnica Abierta solo indicada en pacientes de mayor riesgo (<3%), recuperación corta, y dolor leve.

Para evitar nuevos episodios debe aumentar ejercicio de 2 a 3 horas a la semana.

Prefiera frutas y verduras, evite alimentos con exceso de carbohidratos (golosinas, pasteles o pan blanco).



www.cirujano.ec



Dr. Fernando Torres Jaramillo
FACS
Cirugía General y Laparoscópica
Cirugía Bariátrica (Obesidad) -
Metabólica

